

	<b>Internes Dokument</b>	Dokument-Nr.: QM_id46_ Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Denguefieber Stand: 23.02.2024 Erstellung: 23.02.2024 Änderungen: 0
	<b>Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Denguefieber</b>	

**Reisende Person:** \_\_\_\_\_ **Geb.-Datum:** \_\_\_\_\_  
 (Vor- und Nachname)

**Adresse:** \_\_\_\_\_

**Reiseland/-länder/ zeitlicher Reiseverlauf:** \_\_\_\_\_

## **Wichtige Informationen zur Denguefieber-Impfung mit Qdenga®** **- bitte sorgfältig lesen!**

### **1. Die Erkrankung – Denguefieber**

Denguefieber wird durch das Dengue-Virus (DENV) verursacht, das in 4 verschiedenen Untergruppen (DENV-1 bis DENV-4) in tropischen und subtropischen Regionen vorkommt. Es ist die häufigste, durch Mücken übertragene Viruserkrankung bei Reisenden aus Deutschland und gilt für beruflich Reisende als Berufskrankheit. Es gibt keine spezifischen Behandlungsmöglichkeiten.

Denguefieber ist durch hohes Fieber mit einem zweigipfligen Fiebertverlauf, Kopf- und starken Gliederschmerzen, einem masernähnlichen Hautausschlag, Blutbildveränderungen und Blutungsneigung gekennzeichnet. Schwere Verläufe mit Schock, Blutungen und Beeinträchtigung der Funktion lebenswichtiger Organe sind insgesamt selten, werden jedoch eher bei erneuter Infektion sowie bei Erstinfektionen durch Dengue-Virus Typ 1 (DENV-1) und Dengue-Virus Typ 3 (DENV-3) gesehen. Man kann mehrfach an Denguefieber erkranken, da die durch die Infektion resultierenden Antikörper nur kurze Zeit auch gegen die jeweils anderen Untergruppen schützen.

### **2. Schutz vor Denguefieber – Mückenschutz und Impfung**

Denguefieber wird durch tagsüber stechende, schwarz-weiße Mücken übertragen. Diese Mücken übertragen auch andere Viren, z.B. Chikungunya und Zikavirus. Daher sind Mückenschutzmaßnahmen sinnvoll und wirksam. Darüber hinaus ist eine in Europa zugelassene Impfung seit Februar 2023 in Deutschland verfügbar.

### **3. Wirksamkeit der Impfung Qdenga®**

Die generelle Wirksamkeit gegen Denguefieber aller 4 Untergruppen betrug während eines 4,5-jährigen Beobachtungszeitraums 61%. Die Wirksamkeit gegen schweres Denguefieber mit Krankenhauseinweisung lag in diesem Zeitraum bei 84%. Bei Menschen, die noch nie infiziert waren (sog. Seronegative) betrug die Wirksamkeit 54% gegen Denguefieber und 79% gegen schweres Denguefieber. Bei zuvor schon einmal Infizierten war die Wirksamkeit etwas höher, 64% respektive 86%. Bei einer differenzierten Analyse der 4 Virus-Untergruppen 3 Jahre nach der 2. Impfung zeigt sich ein gemischtes Bild. So konnte bei seronegativen Menschen kein Schutz mehr gegen DENV-3 (Infektion und schwere Infektion) nachgewiesen werden. Wegen fehlender Viruszirkulation im Studienzeitraum konnte kein Schutz gegen DENV-4 nachgewiesen werden.

	<b>Internes Dokument</b>	Dokument-Nr.: QM_id40_ Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Gelbfieber Stand: Mai 2022 Erstellung: 12.05.2022 Änderungen: 0
	<b>Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Gelbfieber</b>	

#### 4. Wer kann von der Impfung profitieren?

Nach gegenwärtigem Wissensstand können nach Abwägung von Nutzen und Risiko vor allem folgende Reisende in Hochrisikogebiete mit Dengue-Übertragung von einer Impfung mit Qdenga® profitieren:

- Langzeit- oder häufig Reisende, z.B. beruflich Entsandte
- Besucher bei Freunden und Verwandten (sog. VFR), die häufige oder längere Aufenthalte dort planen
- Personen, die bereits Denguefieber durchgemacht haben
- Personen mit dem Risiko eines schweren Verlaufs (Schwangerschaft, höheres Lebensalter, Übergewicht, schwere und chronische Vorerkrankungen, Ulkuskrankheit, Bluterkrankungen, Therapie mit Steroiden und Antirheumatika (sog. NSAR).

#### 5. Gegenanzeigen – wer darf nicht geimpft werden

- Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Bestandteile des Impfstoffs oder gegen 1. Dosis von Qdenga®
- Personen mit angeborenen oder erworbenen Störungen des Immunsystems (sog. Immundefizienz)
- Personen, die in den 4 Wochen vor der Impfung immunsuppressive Therapien wie Chemotherapie oder hoch dosierte systemische Kortisonpräparate (Tabletten oder Spritzen) über mindestens 2 Wochen erhalten haben
- Personen mit symptomatischer HIV-Infektion oder Personen mit asymptomatischer HIV-Infektion, bei denen Hinweise auf eine eingeschränkte Immunfunktion vorliegen
- Schwangere und stillende Frauen
- Personen mit einer akuten schweren fieberigen Erkrankung
- Bei Personen, die Immunglobuline oder immunglobulinhaltige Blutprodukte wie Blut oder Plasma erhalten (6 Wochen, besser 3 Monate abwarten)

#### 6. Mögliche unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Impfkomplicationen

Die am häufigsten berichteten Reaktionen waren Schmerzen an der Injektionsstelle (50%), Kopfschmerzen (35%), Muskelschmerzen (31%), Rötung an der Injektionsstelle (27%), Unwohlsein (24%), Schwäche (20%) und Fieber (11%). Diese traten gewöhnlich innerhalb von 2 Tagen nach der Injektion auf, waren leicht bis mittelschwer, von kurzer Dauer (1 bis 3 Tage) und traten nach der ersten Injektion von Qdenga® häufiger auf. Sehr häufig, d.h. bei 1/10 traten Schmerzen und Rötung an der Injektionsstelle, Unwohlsein und Schwäche, Fieber, verminderter Appetit, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Schläfrigkeit (bei Kindern <6 J.), Muskelschmerzen, Infektion der oberen Atemwege auf. Häufig, d.h. bei 1/100 bis <1/10 traten Hals- und Mandelentzündungen, Gelenkschmerzen, Schwellung, Jucken, und blaue Flecken an der Injektionsstelle sowie grippeähnliche Erkrankungen auf. Gelegentlich, d.h. bei 1/1.000 bis <1/100 traten Bronchitis, Schnupfen, Schwindelgefühl, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerz, Ausschlag, Juckreiz, Urtikaria, Blutung an der Injektionsstelle und Ermüdung auf. Sehr selten, d.h. bei <1/10.000 wurde eine Schwellung der Haut und Unterhaut (sog. Angioödem) beobachtet.

Bei 49 % der Studienteilnehmer ohne vorherige DENV-Infektion und bei 16 % der Studienteilnehmer mit vorheriger DENV-Infektion wurden meist in der 2. Woche nach der ersten Injektion für ca. 4 Tage Impfviren im Blut nachgewiesen. Diese sog. Impfvirämie ging mit leichten bis mittelschweren Symptomen wie Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Ausschlag einher. Nach der zweiten Dosis wurde diese Impfvirämie nur selten beobachtet.

	<b>Internes Dokument</b>	Dokument-Nr.: QM_id40_ Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Gelbfieber Stand: Mai 2022 Erstellung: 12.05.2022 Änderungen: 0
	<b>Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Gelbfieber</b>	

### 7. Information zur Durchführung und Verhalten nach der Impfung

Die Impfung erfolgt mit einem abgeschwächten, modifizierten Dengue-Virus, das genetische Information aller 4 Untergruppen trägt (sog. tetravalenter Lebendimpfstoff). Sie ist bei Personen ab vollendetem 4. Lebensjahr zugelassen. Die Impfung wird zweimal im Abstand von drei Monaten ausschließlich subkutan (d.h. unter die Haut) gegeben. Nach der Impfung ist für mindestens einen Monat eine Schwangerschaft zu vermeiden.

Eine Kombination mit der Hepatitis A-Impfung ist untersucht und möglich. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Gelbfieberimpfstoff waren die Antikörperantworten auf Qdenga® verringert. Ein 4-wöchiger Abstand zu anderen Lebendimpfungen (z.B. Masern) muss beachtet werden.

Für die Dauer von 14 Tagen bis zum Abklingen möglicher Impfreaktionen sollten Sie sich keinen starken körperlichen Belastungen aussetzen (z. B. Leistungssport, geplante Operationen, Sauna) und Sonnenbäder sowie übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden. Für 4 Wochen nach der Impfung dürfen Sie kein Blut spenden.

Sollten im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung unerwartete Symptome auftreten, die Sie auf die Impfung zurückführen, konsultieren Sie eine Ärztin/einen Arzt

#### Chargensticker:

	<b>Internes Dokument</b>	Dokument-Nr.: QM_id40_ Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Gelbfieber Stand: Mai 2022 Erstellung: 12.05.2022 Änderungen: 0
	<b>Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Gelbfieber</b>	

**Zur Abschätzung des Risikos möglicher Nebenwirkungen durch die Impfung und zum Ausschluss von Gegenanzeigen beantworten Sie bitte folgende Fragen:**

		JA	NEIN
1.	Ist oder war bei Ihnen eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Impfstoffe bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Haben Sie in letzter Zeit körperliche Veränderungen/Störungen Ihres Allgemeinbefindens bemerkt; hatten Sie in den letzten Tagen Fieber? wenn ja, was/welche und wann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ist Ihre körpereigene Abwehr (Immunsystem) durch eine Krankheit (z. B. innere Erkrankung, HIV-Infektion) oder durch bestimmte Behandlungen (Chemotherapie, Hyposensibilisierung, Antikörpergabe, Kortisontherapie, Strahlentherapie, Transplantation) beeinträchtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Nehmen Sie Medikamente ein oder bekommen Sie Medikamente gespritzt? Falls ja, welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Erhalten oder erhielten Sie Immunglobuline oder immunglobulinhaltige Blutprodukte wie Blut oder Plasma in den letzten 3 Monaten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wurden Sie während der letzten 4 Wochen geimpft? Falls ja, wogegen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Sind sie bei früheren Impfungen ohnmächtig geworden? Hatten Sie bei der Impfung Schwächegefühl?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Nur für <b>Frauen</b> : Sind Sie <b>schwanger</b> , planen Sie eine Schwangerschaft in den nächsten 4 Wochen oder <b>stillen</b> Sie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anmerkung des Impfarztes / der Impfärztin zum Aufklärungsgespräch:**

(z. B. individuelle Risiken, mögliche Komplikationen, spezielle Fragen, Wiederimpfungen etc.)

**Über die Dengueimpfung und ihre möglichen Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen wurde ich umfassend informiert. Ich habe das Aufklärungs-Merkblatt sowie den Fragebogen vollständig gelesen, verstanden und zutreffend beantwortet. Ich hatte die Möglichkeit, alle mich interessierenden Fragen mit dem Arzt / der Ärztin zu besprechen und habe keine weiteren Fragen mehr.**

Aufklärung und Impfung durchgeführt:

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Impfarzt/-ärztin)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Patient/in ggf. Erziehungsberechtigte/r)

**QS-Vermerk:**

**Druckdatum: 12.05.2022**

Seite: 4

**Dateiname:** Daten (X:) > QM > QM-System\_exc\_2010 > QM-Handbuch > 05 interne Dokumente > Dokument-Nr.: QM\_id46\_Aufklärungsmerkblatt und Einverständniserklärung vor Impfungen gegen Denguefieber